

## Punteruolo nero del fico – *Aclees taiwanensis*

Gentili Signore, egregi Signori,

durante il mese di giugno di quest'anno il Servizio fitosanitario cantonale ha confermato la presenza del punteruolo nero del fico (*Aclees taiwanensis*, At, cfr. Figura 1) inizialmente segnalato da un utente. Si tratta di un coleottero asiatico (areale d'origine: Giappone, Cina e Taiwan), appartenente alla famiglia dei Curculionidi. È stato trovato in diverse zone del comune di Balerna e a Novazzano, non si esclude quindi che possa essere presente anche in altre regioni del Mendrisiotto.



Figura 1: punteruolo nero del fico (*Aclees taiwanensis*), curculionide le cui larve danneggiano irrimediabilmente la base degli alberi di fico. Novazzano, 18.6.2024. Foto: Luca Driutti

Sebbene non si tratti di un organismo da quarantena, At è un insetto temuto in particolare dai vivaisti, perché si diffonde facilmente tramite gli scambi commerciali. È già presente in Francia e in buona parte dell'Italia, dov'è stato segnalato per la prima volta nel 2005 proprio da un vivaista che ha notato dei danni (cfr. Figura 2) alla base di giovani piante in vendita.



Figura 2: gallerie presenti alla base del tronco di fico, ad opera delle larve del punteruolo nero. Balerna, 19.06.2024. Foto: Tiziano Riva

### Piante colpite e danni:

Solitamente At attacca le piante del genere *Ficus* spp., rappresentando quindi una grave minaccia per il fico comune, *Ficus carica*.

Gli adulti di At si nutrono infatti di gemme, foglie e infruttescenze, defogliando le piante e rendendo invendibili i frutti.

Le larve di questo insetto invece agiscono all'interno della pianta, in quanto si sviluppano scavando numerose gallerie nel legno sottocorticale, compromettono la vitalità della pianta. I sintomi di un simile attacco mostrano dapprima un deperimento generale che può sfociare alla morte dell'albero. Il

processo di deterioramento viene inoltre accelerato da altre infezioni, in particolare fungine, che trovano una via facilitata di penetrazione dalle gallerie e dai fori di emersione degli adulti.

### Ciclo:

Gli adulti svernanti riprendono la loro attività in primavera, quando fuoriescono dagli interstizi della corteccia o dalle radici del fico per cibarsi e accoppiarsi. Dopo di che le femmine depongono le uova singolarmente nella corteccia dell'albero, all'altezza del colletto o delle radici affioranti. Ogni femmina è in grado di deporre fino a 200 uova durante la sua esistenza, da cui nascono le larve che iniziano a svilupparsi, scavando importanti gallerie all'interno del tronco. In questa fase si possono notare delle colature di rosura bagnata di colore aranciato che fuoriescono dalla corteccia. Una volta adulti, i coleotteri emergono dalla corteccia per andare a nutrirsi di giovani germogli, foglie e frutticini, attività che svolgono prioritariamente di notte. Durante il giorno tendono a nascondersi nella vegetazione, alla base del tronco.

**Cosa fare:**

In generale si consiglia, in particolare agli abitanti del Mendrisiotto proprietari di piante di fico, di monitorarne la base dei tronchi alla ricerca di fori di sfarfallamento o rosura. In caso di ritrovamenti sospetti, contattare tempestivamente il Servizio fitosanitario cantonale.

Vista la sua capacità di diffusione, riportiamo alcuni consigli di gestione che possono risultare utili sia ai privati che ai manutentori del verde:

**1. Monitoraggio e prevenzione:**

controllare accuratamente i fichi e cercare l'eventuale presenza degli adulti o dei segni di attività larvale di At. Per limitare l'ovideposizione alla base della pianta è possibile coprire l'area del colletto con un telo o una rete molto fine. In caso di sospetta presenza, bagnare abbondantemente il terreno e spruzzare acqua nei fori di sfarfallamento in modo da spingere gli adulti a fuoriuscire dal tronco per catturali.

**2. Segnalazione:**

in caso di ritrovamenti sospetti, contattare il Servizio fitosanitario allegando delle fotografie dei sintomi e/o degli insetti e indicando il luogo esatto del ritrovamento. Mail di contatto: [servizio.fitosanitario@ti.ch](mailto:servizio.fitosanitario@ti.ch).

**3. Lotta:**

Attualmente non esistono prodotti fitosanitari omologati per combattere questo insetto, la cattura manuale degli adulti risulta quindi il metodo più efficace.

Ringraziamo già sin d'ora tutti i Comuni che vorranno rendere pubbliche queste informazioni e divulgarle al personale tecnico.

Cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti,

**PER IL SERVIZIO FITOSANITARIO**

La responsabile:

Cristina Marazzi